

Geachte Heer, Mevrouw,

U verlaat het dagziekenhuis na een kleine chirurgische ingreep. Met deze folder willen we u enkele wenken geven die belangrijk zijn na de ingreep. Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelende arts of met het dagziekenhuis.

Als u onder algemene anesthesie bent geweest, zal een verpleegkundige van het dagziekenhuis u de dag na de ingreep thuis opbellen. Wees niet ongerust! Dit is de gewoonte. Wij willen weten hoe u herstelt van de anesthesie en de ingreep.

Wij wensen u een spoedig herstel.

*Het dagziekenhuis is open
van maandag tot en met vrijdag
van 07.00 u tot 18.00 u*

tel. 03 444 12 46 - fax 03 444 12 47



campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. 03 444 12 11
fax 03 444 13 11

www.st-jozef.be
GasthuisZusters
Antwerpen

dagziekenhuis Wat u weten moet na een facelift

Na een verdoving

Als u een algemene anesthesie of een lokale anesthesie met bijkomende medicatie heeft gehad, hou dan rekening met de volgende richtlijnen.

Bij het verlaten van het ziekenhuis moet een volwassen persoon u begeleiden. Ook de eerste 24 uur na de ingreep mag u niet alleen blijven.

Na een algemene verdoving kunt u zich wat slaperig, ijl of duizelig voelen. Daarom mag u de eerste 24 uur geen voertuigen of machines besturen, alcohol gebruiken of belangrijke documenten ondertekenen.

Start geleidelijk aan weer met eten: eerst kunt u wat drinken, daarna mag u een lichte voeding nemen en pas daarna kunt u weer gewoon eten.

Na een algemene verdoving kunt u zich onwel of misselijk voelen. Dit gaat meestal snel voorbij. Als u zeer misselijk bent of na 24 uur nog onwel zou zijn, neem dan contact op met het dagziekenhuis.

Als u medicatie neemt op voorschrift van uw huisarts, dan start u deze terug de dag na de ingreep.

Omschrijving van de ingreep

De facelift is een operatieve behandeling waarbij rimpels en plooiën van de gezichtshuid worden strakgetrokken, meestal samen met de dieper gelegen weefsellagen. De ingreep heeft geen effect op rimpels op het voorhoofd, rond de mond of de oogleden. Hiervoor is een aparte behandeling noodzakelijk.

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden tijdens het gesprek. Het gebruik van deze medicijnen moet meestal drie tot tien dagen voor de facelift worden gestaakt. Daarnaast wordt aangeraden minstens zes weken van tevoren te stoppen met roken, want roken vernauwt de bloedvaten waardoor stoornissen in de wondgenezing op kunnen treden.

Waar u verder nog aan denken moet

Mogelijke gevolgen:

- Mogelijke zwelling van gezicht en hals.
- Verkleuring.
- Zichtbaar resultaat na enkele weken.

Wat te doen:

- Pijnstilling: Indien nodig neemt u de voorgeschreven pijnstillers.
- Verband: de specialist zal op de volgende consultatie uw verband verzorgen.

In het begin: oppassen met een douche en haarwassing.

Na uw ingreep

Bij hoge koorts (boven 38,5 °C) of pijn die niet onder controle is met de voorgestelde pijnstilling kunt u terecht bij:

- Uw huisarts
- Uw behandelende chirurg
- Heelkundige wachtdienst van het ziekenhuis
Tel: 03 444.12.11
- Het dagziekenhuis (van 08.00u tot 18.00u)
Tel: 03 444.12.46

Bent u onverwacht verhinderd?
Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen via het nummer waarop u de afspraak heeft gemaakt. Indien wij niet op de hoogte zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.