

*Geachte Heer, Mevrouw,*

*U verlaat het dagziekenhuis na een kleine chirurgische ingreep. Met deze folder willen we u enkele wenken geven die belangrijk zijn na de ingreep. Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelende arts of met het dagziekenhuis.*

*Als u onder algemene anesthesie bent geweest, zal een verpleegkundige van het dagziekenhuis u de dag na de ingreep thuis opbellen. Wees niet ongerust! Dit is de gewoonte. Wij willen weten hoe u herstelt van de anesthesie en de ingreep.*

*Wij wensen u een spoedig herstel.*

*Het dagziekenhuis is open  
van maandag tot en met vrijdag  
van 07.00 u tot 18.00 u*

*tel. 03 444 12 46 - fax 03 444 12 47*



campus Sint-Jozef  
Molenstraat 19  
2640 Mortsel  
tel. 03 444 12 11  
fax 03 444 13 11

[www.st-jozef.be](http://www.st-jozef.be)  
GasthuisZusters  
Antwerpen

## dagziekenhuis Wat u weten moet bij bartholinitis

## Na een verdoving

Als u een algemene anesthesie of een lokale anesthesie met bijkomende medicatie heeft gehad, hou dan rekening met de volgende richtlijnen.

Bij het verlaten van het ziekenhuis moet een volwassen persoon u begeleiden. Ook de eerste 24 uur na de ingreep mag u niet alleen blijven.

Na een algemene verdoving kan u zich wat slaperig, ijl of duizelig voelen. Daarom mag u de eerste 24 uur geen voertuigen of machines besturen, alcohol gebruiken of belangrijke documenten ondertekenen.

Start geleidelijk aan weer met eten: eerst kan u wat drinken, daarna mag u een lichte voeding nemen en pas daarna kan u weer gewoon eten.

Na een algemene verdoving kan u zich onwel of misselijk voelen. Dit gaat meestal snel voorbij. Als u zeer misselijk bent of na 24 uur nog onwel zou zijn, neem dan contact op met het dagziekenhuis.

Als u medicatie neemt op voorschrift van uw huisarts, dan start u deze terug de dag na de ingreep.

## Omschrijving van de ingreep en waar u verder nog aan denken moet

Een ontsteking van de klier van Bartholin geeft een pijnlijke zwelling.

De ontstoken klier werd verwijderd. De klier bevindt zich rechts of links van de vagina, een plaats die extra gevoelig is en een hoge vascularisatie (doorbloeding) heeft.

Na de ingreep

- Pijn vooral de eerste drie dagen volgend op de ingreep. Hierna vermindert de pijn spontaan.
- Gedurende de eerste uren na de ingreep bevindt er zich een wiek in de biopsieholte die verwijderd wordt voor u naar huis gaat.
- Een hematoom (blauwe verkleuring) kan optreden rond de biopsieholte.

Wat te doen

- Pijnstilling: indien nodig neemt u de voorgeschreven pijnstillers
- Wondcontrole op dag 7 of 8 na de ingreep bij de huisarts of volgens afspraak. Hechtingen moeten niet verwijderd worden.
- Antibiotica volgens advies van de gynaecoloog
- Alleen op advies van de geneesheer: zitbad met Isobetadine® gynaecologische oplossing gedurende een 3-tal dagen. Hierna de wonde grondig spoelen met lauw water.

## Na uw ingreep

Bij koorts (+ 38°C), pijn die niet onder controle is d.m.v. de voorgestelde pijnstilling en/of zwelling, kan u terecht bij:

- uw huisarts
- uw behandelende chirurg
- het dagziekenhuis (van 08.00 u tot 18.00 u) tel. 03 444 12 46
- de heelkundige wachtdienst van het ziekenhuis tel. 03 444 12 11

Bent u onverwacht verhinderd?

Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen via het nummer waarop u de afspraak heeft gemaakt. Indien wij niet op de hoogte zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.