

*Geachte Heer, Mevrouw,*

*U verlaat het dagziekenhuis na een kleine chirurgische ingreep. Met deze folder willen we u enkele wenken geven die belangrijk zijn na de ingreep. Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelende arts of met het dagziekenhuis.*

*Als u onder algemene anesthesie bent geweest, zal een verpleegkundige van het dagziekenhuis u de dag na de ingreep thuis opbellen. Wees niet ongerust ! Dit is de gewoonte. Wij willen weten hoe u herstelt van de anesthesie en de ingreep.*

*Wij wensen u een spoedig herstel.*

*Het dagziekenhuis is open  
van maandag tot en met vrijdag  
van 07.00 u tot 18.00 u*

*tel. 03 444 12 46 - fax 03 444 12 47*



campus Sint-Jozef  
Molenstraat 19  
2640 Mortsel  
tel. 03 444 12 11  
fax 03 444 13 11

[www.st-jozef.be](http://www.st-jozef.be)  
GasthuisZusters  
Antwerpen

dagziekenhuis  
**Wat u weten moet  
na een operatie  
van Condylomata  
Accuminata**

## Na een verdoving

Als u een algemene anesthesie of een lokale anesthesie met bijkomende medicatie heeft gehad, hou dan rekening met de volgende richtlijnen.

Bij het verlaten van het ziekenhuis moet een volwassen persoon u begeleiden. Ook de eerste 24 uur na de ingreep mag u niet alleen blijven.

Na een algemene verdoving kan u zich wat slaperig, ijl of duizelig voelen. Daarom mag u de eerste 24 uur geen voertuigen of machines besturen, alcohol gebruiken of belangrijke documenten ondertekenen.

Start geleidelijk aan weer met eten: eerst kan u wat drinken, daarna mag u een lichte voeding nemen en pas daarna kan u weer gewoon eten.

Na een algemene verdoving kan u zich onwel of misselijk voelen. Dit gaat meestal snel voorbij. Als u zeer misselijk bent of na 24 uur nog onwel zou zijn, neem dan contact op met het dagziekenhuis.

Als u medicatie neemt op voorschrift van uw huisarts, dan start u deze terug de dag na de ingreep.

## Waar u verder nog aan denken moet

Condylomata zijn wratachtige letsels t.h.v. de vagina, perineum en/of aars.

D.m.v. een elektrocoagulatie techniek worden de letsels verbrand. De ingreep wordt uitgevoerd onder lokale of algemene narcose.

Mogelijke gevolgen:

- Bruin waterig verlies t.g.v. de brandwonden gedurende enkele dagen
- Pijn is afhankelijk van de uitgebreidheid van de letsels

Wat te doen:

- Pijnstilling: Indien nodig neemt u de voorgeschreven pijnstillers
- GEEN seksueel contact tot 3 weken na de ingreep
- GEEN inwendig maandverband (tampon)
- Zelfcontrole en bij het geringste wratachtig letsel contact opnemen met uw huisarts of gynaecoloog. Een klein beperkt letsel kan met een vloeistof aangestipt worden waardoor men een verdere uitbreiding voorkomt.
- Medische controle na 10 dagen
- Controle bij uw partner

## Na uw ingreep

Bij koorts (+ 38° C), pijn die niet onder controle is met de voorgestelde pijnstilling dan kan u terecht bij:

- uw huisarts
- uw behandelende chirurg
- het dagziekenhuis (van 08.00 u tot 18.00 u)  
tel. 03 444 12 46
- de heelkundige wachtdienst van het ziekenhuis  
tel. 03 444 12 11

Bent u onverwacht verhinderd?

Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen via het nummer waarop u de afspraak heeft gemaakt. Indien wij niet op de hoogte zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.