

## INSTRUCTIES NA LAPAROSCOPISCH VERWIJDEREN GALBLAAS

Tijdens deze ingreep werd uw galblaas verwijderd:

Het is normaal dat u zich misschien gedurende korte tijd misselijk voelt en ook dat uw buik wat opgeblazen voorkomt.

Na de ingreep moet u zeker gedurende 2 weken het rustig aan doen: u mag normaal bewegen, wandelen en zelfs trappen doen zonder echter zware gewichten op te heffen.

Na een tiental dagen na de ingreep mogen de draadjes verwijderd worden, in principe door de huisarts.

Aangeraden wordt uw voeding wat te beperken tot licht verteerbaar en vetarm voedsel en dit gedurende enkele weken.

Een controle consultatie bij ons wordt voorzien meestal 1 maand na de ingreep.

Wanneer moet u vroeger dan voorzien Uw huisarts of ons contacteren ?

- indien u koorts maakt (38 ° C of meer)
- indien er abnormaal veel vocht uit de wonde(n) komt
- indien u abnormaal veel pijn heeft
- indien u op de plaats van de operatie een abnormale zwelling bemerkt

Wij zijn steeds bereikbaar via het ziekenhuis op 03 444 12 11.

Dienst algemene en digestieve heelkunde  
Proctologie

Afspraken tel: 03 444 12 11

Dr. Eric Meir  
Dr. Fernando Sirbu