

Wat u moet weten

over het plaatsen van
een JJ-stent

Geachte heer, mevrouw

U verlaat het dagziekenhuis na een kleine chirurgische ingreep. Met deze folder willen we u enkele wenken geven die belangrijk zijn na de ingreep. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelende arts of met het dagziekenhuis.

Als u onder algemene anesthesie bent geweest, zal een verpleegkundige van het dagziekenhuis u de dag na de ingreep thuis opbellen. Wees niet ongerust. Dit is de gewoonte. Wij willen weten hoe u herstelt van de anesthesie en de ingreep.

Wij wensen u een spoedig herstel.

*Het dagziekenhuis is open
van maandag tot en met vrijdag
van 7 tot 18 uur.*

tel. 03 444 12 46 - fax 03 444 12 47



campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
BE-2640 MORTSEL
tel. + 32 3 444 12 11

www.gzaziekenhuizen.be

Het plaatsen JJ-stent

In overleg met uw uroloog is besloten een JJ-stent bij u te plaatsen. U leest hier waarom een JJ-stent soms nodig is en hoe de plaatsing ervan in zijn werk gaat.

Waarom wordt een JJ-stent ingebracht?

Soms is de afvoer van urine uit de nier naar de blaas geblokkeerd. Bijvoorbeeld door een steen of een vernauwing van de urineleider. De urine kan er dan niet langs en er ontstaat stuwung in de nier. De uroloog brengt een JJ-stent in om te waarborgen dat de urine uit de nier wordt afgevoerd naar de blaas.

Wat is een JJ-stent ?

Een JJ-stent is een hol, soepel buisje, waardoor urine uit de nier naar de blaas kan stromen. De JJ-stent is een zogenaamde inwendige stent. Door de krullen aan beide uiteinden blijft de JJ-stent goed op zijn plaats liggen. Een JJ-stent wordt via een cystoscoop ingebracht. Dit is een dun kijkinstrument.

Na de ingreep

Na het inbrengen van de stent kunt u bij het plassen een branderig gevoel hebben.

De eerste uren na de ingreep kan er ook wat bloed in de urine zitten. Dit is normaal. Het is aan te raden veel te drinken na de ingreep, dit bevordert het herstel van de blaas en het plaskanaal. Eventuele bloedstolseltjes kunnen dan ook gemakkelijker worden uitgeplast.

Het verwijderen van een JJ-stent

Het verwijderen van de stent gaat op dezelfde manier als het inbrengen. Via een cystoscoop wordt de stent met een klein tangetje naar buiten getrokken. Dit is niet pijnlijk.

Na een verdoving

Als u een algemene anesthesie of een lokale anesthesie met bijkomende medicatie heeft gehad, houdt u best rekening met de volgende richtlijnen. Bij het verlaten van het ziekenhuis moet een volwassen persoon u begeleiden. Ook de eerste 24 uur na de ingreep mag u niet alleen blijven.

Na een algemene verdoving kunt u zich wat slaperig, ijl of duizelig voelen. Daarom mag u de eerste 24 uur geen voertuigen of machines besturen, alcohol gebruiken of belangrijke documenten ondertekenen.

Start geleidelijk aan weer met eten: eerst kunt u wat drinken, daarna mag u een lichte voeding nemen en pas daarna kunt u weer gewoon eten.

Na een algemene verdoving kunt u zich onwel of misselijk voelen. Dit gaat meestal snel voorbij. Als u zeer misselijk bent of na 24 uur nog onwel zou zijn, neem dan contact op met het dagziekenhuis.

Als u medicatie neemt op voorschrift van uw huisarts, dan start u deze terug de dag na de ingreep.

Wanneer u aanhoudend veel pijn hebt, of bij koorts hoger dan 38,5 °c verwittigt u best de behandeld arts of huisarts.

Bent u onverwacht verhinderd?

Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen via het nummer waarop u de afspraak heeft gemaakt. Indien wij niet op de hoogte zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.