

TOESTEMMINGSFORMULIER EPIDURALE INFILTRATIE

Sint-Jozef
GZA . Ziekenhuizen



DAGZIEKENHUIS
03 444 12 46

Op vraag van Dr.

heeft u een afspraak voor een epidurale infiltratie op volgende dagen :

Deze behandeling wordt uitgevoerd op het dagziekenhuis. U laat zich daar inschrijven.

Wat moet u doen voor de behandeling ?

- U moet niet nuchter zijn.
- U meldt zich aan op het afgesproken uur met de verwijzingsbrief van de aanvragende geneesheer en dit informatief document, ondertekend door uzelf.
- U treft de nodige schikkingen voor begeleiding en vervoer naar huis, omdat u nadien niet zelf de wagen mag besturen.
- Gelieve eventuele allergieën vóór de behandeling te melden.
- Indien u **bloedverdunnende medicatie inneemt** :
 - **Salicylaten:** **Asaflow®**, **Acenterine®**, **Alka Seltzer®**, **Aspegic®**, **Aspirine®**, **Aspro®**, **Cardioaspirine®**, **Cardegic®**, **Cardiphar®**, **Dispril®**, **Sedergine®**
 - neemt u 160 mg of minder per dag dan dient u deze medicatie niet te stoppen.
 - neemt u méér dan 160 mg per dag dan moet u deze medicatie stoppen 3 dagen vóór de infiltratie.
 - **Plavix®**: te stoppen 7 dagen vóór de epidurale infiltratie.
 - **Ticlid®**: te stoppen 10 dagen vóór de epidurale infiltratie.
 - **Marcoumar®**, **Marevan®**, **Sintrom®**: dient ± 7 dagen op voorhand gestopt te worden in overleg met de huisarts; bloedcontrole is noodzakelijk. Er wordt eventueel overgeschakeld op Fraxiparine® of Clexane®.
 - **Fraxiparine®**, **Clexane®**: mag niet toegediend worden in de periode van 12 uur vóór de ingreep tot 4 uur erna.
 - **Fraxodi®**: mag niet toegediend worden in de periode van 24 uur vóór de ingreep tot 4 uur erna.
 - **Arixtra®**: mag niet toegediend worden in de periode van 36 uur vóór de ingreep tot 12 uur erna.
 - **Xarelto®**: mag niet toegediend worden in de periode van 24 uur voor de ingreep tot 12 uur erna.

Hoe verloopt de behandeling ?

De behandeling duurt ongeveer 15 minuten. U krijgt een inspuiting ter hoogte van de lage rug (lumbale epidurale) of ter hoogte van de hals (cervicale epidurale). Er wordt een lokaal verdovingsmiddel en een corticoïd ingespoten. U dient een goed ontspannen houding aan te nemen. Deze pijnbestrijdende behandeling wordt eventueel herhaald, met een tussentijd van één tot twee weken.

Wat na de behandeling ?

- Na de behandeling wordt de bloeddruk gecontroleerd. Als deze in orde is, mag u het ziekenhuis verlaten.
- Na de behandeling mag u in géén geval zelf een voertuig besturen.
- Probeer het rustig aan te doen de dag van de behandeling en niet te gaan werken. Wees voorzichtig met het nemen van trappen.
- De dag na de behandeling kan u de gewone activiteiten hervatten.
- Een technisch correct uitgevoerde epidurale infiltratie kan, zoals elke behandeling, enkele nevenwerkingen hebben, waaronder :
 - bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een infuus
 - meer uitgebreide of verlengde werking van de lokale verdoving
 - een licht gevoel van gejaagdheid, een blos op de wangen of een lichte gewichtstoename, komen sporadisch voor door de medicatie
 - onvoorziën binnendringen van de punt van de naald in het ruggenmergvocht, wat nadien soms hoofdpijn kan veroorzaken

Zulke mogelijke nevenwerkingen zijn inherent aan deze techniek. Ze worden door de behandelende arts nagegaan, onderkend en -indien nodig- gecorrigeerd.

Gelezen en akkoord op datum

Naam patiënt Handtekening

SJ-OK
0000/203/7
31.10.2012