

Een rectale echo-endoscopie

Wat u moet weten

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11

campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 2000

campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. + 32 3 444 12 11

www.gzaziekenhuizen.be

Mevrouw, Mijnheer

Welkom op verpleegeenheid 4. In overleg met uw behandelend arts ondergaat u straks een rectale echo-endoscopie.

In deze brochure vindt u algemene informatie over het verloop en de voorbereiding ervan. Omdat er bij elk invasief onderzoek (waarbij we een instrument in een orgaan brengen) een kleine kans bestaat op complicaties, vragen we u deze informatie aandachtig te lezen. Zo krijgt u een beter inzicht in het onderzoek en kunt u ons ook verwittigen wanneer u denkt een risicopatiënt te zijn.

Als u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelend arts of met het verpleegkundig personeel.

1. Doel van het onderzoek

De rectale echo-endoscopie combineert de endoscopie met een echografie en doet eigenlijk een echografie “van binnenuit”. Deze techniek biedt ons een onovertroffen zicht op de wanden van de dikke darm en het anaal kanaal, maar ook op de omliggende organen.

Eventueel gebeurt er niet enkel een onderzoek, maar neemt de arts ook een stukje weefsel (biopsie) van mogelijke afwijkingen waarvan we de exacte aard moeten kennen.

Het onderzoek gebeurt met een endoscoop: een soepel buisje dat de arts via de aars inbrengt.

2. De voorbereiding

Meestal krijgt u een tweetal lavementen toegediend om de dikke darm proper te maken. Het zicht en de beoordeling van de wand van de dikke darm mogen immers niet beperkt worden door stoelgang.

Verwittig ons indien u allergisch bent voor bepaalde medicatie. Meld ons ook als u hart- of longproblemen hebt en of u bij de tandarts antibiotica moet innemen vóór de behandeling. Bijvoorbeeld omdat u een hart hebt met een kunstklep.

3. Het onderzoek

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt maximaal een twintigtal minuten. Het instrument wordt via de aars binnengebracht zodat de arts de wand en omliggende organen kan bekijken.

Mogelijke complicaties

Een rectale echo-endoscopie kent weinig risico's of complicaties. Toch kan geen enkele arts het succes of de afwezigheid van risico's bij het onderzoek garanderen. We nemen zo veel mogelijk voorzorgen om de ongemakken en de risico's te beperken. Zo worden de toestellen en toebehoren grondig gedesinfecteerd of gesteriliseerd vóór gebruik.

Zwaardere complicaties zoals een perforatie of ernstige bloeding zijn zeer zeldzaam.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u een opgeblazen gevoel hebben door de lucht die tijdens het onderzoek werd ingeblazen. Het is belangrijk om op het toilet te proberen om deze lucht te laten ontsnappen. Zo vermindert u aanzienlijk het risico op krampen na het onderzoek.

Als u een verdoving kreeg, laat u zich best naar huis vervoeren. Uw vertraagde reflexen maken het autorijden immers onveilig.

Na een verdoving raden we u ook aan om de rest van de dag geen belangrijke beslissingen te nemen of risicovolle activiteiten uit te voeren.

5. Aandachtspunten

Bij weigering

Wanneer een rectale echo-endoscopie noodzakelijk wordt geacht door uw arts maar u deze toch weigert, bestaat de kans dat we een (op dat moment nog behandelbare) ziekte niet ontdekken. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

Voor dit onderzoek moet u NIET nuchter zijn.

- Als u stollingsproblemen hebt of Aspirine® of aspirinebevattende medicijnen gebruikt zoals: Marevan®, Marcoumar®, Ticlid® of Sintrom®, brengt u ons hiervan op de hoogte.
- Meld eventuele allergieën of intolerantie voor medicijnen.
- Gelieve ons te melden of u bij de tandarts voor een behandeling antibiotica moet innemen.
- Wanneer u een verdoving kreeg, zorgt u best voor vervoer naar huis. Door de verdoving zijn uw reflexen immers vertraagd en is autorijden verboden. Vermijd ook belangrijke beslissingen en risicovolle activiteiten op de dag van het onderzoek.

Om het risico op complicaties te voorkomen of te beperken, neemt u volgende richtlijnen in acht:

- neem geen Aspirine® of aspirinebevattende medicijnen, Marevan®, Marcoumar®, Ticlid® of Sintrom®, tenzij dit anders is afgesproken met uw arts;
- contacteer de arts bij koorts boven 38°, zwarte of bloederige stoelgang of wanneer er andere zaken zijn die u ongerust maken.

Bent u onverwacht verhinderd?

Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen via het nummer waar u de afspraak gemaakt hebt. Indien wij niet op de hoogte zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.