

00020451 - © GZA - juli 2022

Aanvullende vaccinaties kinderen



campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11

campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 2000

campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. + 32 3 444 12 11

BTW BE 0428.651.017 - RPR Antwerpen
gzaziekenhuizen@gza.be
www.gzaziekenhuizen.be

GZA 

Ziekenhuizen
GasthuisZusters Antwerpen
Sint-Augustinus · Sint-Vincentius · Sint-Jozef

Beste ouder

Vaccinaties beschermen niet alleen je kind zelf tegen ernstige infecties, maar ook jouw gezin en de omgeving. **Naast het klassieke vaccinatieschema** van Kind en Gezin, worden er **nog een aantal vaccinaties sterk aanbevolen**. Aan de hand van deze brochure willen we je hierover informeren.

Mocht je na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan je arts.

Voor een afspraak op de dienst pediatrie op campus Sint-Vincentius kan je terecht op 03 285 28 35, op campus Sint-Augustinus op 03 443 38 96 en in Polikliniek Hof Ter Schelde op 03 443 34 43. Een online afspraak maken is ook mogelijk via mijn.zas.be.

Vaccinatie tegen meningococcen

Meningococcen veroorzaken een ernstige vorm van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Een meningococceninfectie kan in de loop van enkele uren levensbedreigend zijn.

Vooraf kinderen van 0 tot 5 jaar en jongvolwassenen (15 tot 19 jaar) worden erdoor getroffen.

Er bestaan verschillende types meningococcen. Het vaccin tegen meningococcen type C zit in het basisvaccinatieschema (van Kind en Gezin), en wordt toegediend op 15 maanden.

Vaccin meningococcen type B

Er bestaat nu ook een vaccin tegen meningococcen type B, dat nog niet in het vaccinatieschema van Kind en Gezin zit.

Reacties op dit vaccin (koorts en lokale roodheid) kunnen wat heviger zijn, zeker wanneer ze samen met andere vaccins worden toegediend. De bijwerkingen zijn minder hevig indien je **net voor de vaccinatie paracetamol toedient**. Dien na de vaccinatie nog **twee dosissen paracetamol** toe met een tussentijd van 4 tot 6 uur.

Het vaccin tegen meningococcen B kan worden gegeven vanaf de leeftijd van 2 maanden. De prijs per dosis bedraagt ongeveer 90,00 euro. Deze vaccinatie wordt op dit moment nog niet terugbetaald. Informeer bij je mutualiteit naar eventuele deelname in de kostprijs.

Bij opstart na de leeftijd van **2 maanden** zijn er **3 dosissen** nodig (2 injecties met 2 maanden interval en een booster na \pm 1 jaar).

Bij opstart na de leeftijd van **2 jaar** zijn er **2 dosissen** nodig (2 injecties met 1 maand interval zonder booster).

Gecombineerd vaccin meningococcen types A, C, W, Y

Er bestaat ook een gecombineerd vaccin tegen meningococcen types A, C, W, Y dat niet in het vaccinatieschema van Kind en Gezin zit. Serotypes A, W en Y komen voornamelijk voor in Subsaharisch Afrika, waardoor deze vaccinatie gedurende lange tijd onder de reisvaccinatie viel. Sinds 2018 worden in Nederland en België echter meer gevallen gezien van besmetting met meningococcen W en Y bij adolescenten. Hierdoor wordt dit vaccin nu ook aangeboden op de leeftijd van 15 maanden (ter vervanging van het vaccin tegen enkel meningococcen type C uit het vaccinatieschema van Kind en Gezin) en voor alle tieners van 15 tot 18 jaar.

Het vaccin kan in principe al worden toegediend vanaf de leeftijd van 2 maanden. De prijs per dosis bedraagt ongeveer 50,00 euro. Dit vaccin wordt niet terugbetaald. Informeer bij je mutualiteit naar eventuele deelname in de kostprijs.

Bij opstart na de leeftijd van **2 maanden** zijn er **3 dosissen** nodig (2 injecties met 2 maanden interval en een booster na \pm 1 jaar).

Bij opstart na de leeftijd van **1 jaar** is er **1 dosis** nodig en is herhalingsvaccinatie enkel nodig bij een reis naar risicogebieden.

Vaccinatie tegen Varicella (windpokken)

Bijna iedereen krijgt als kind windpokken; het is een typische kinderziekte. Kinderen genezen meestal na enkele dagen. Na genezing ben je levenslang tegen windpokken beschermd. Het virus blijft echter wel sluimerend aanwezig in het lichaam. Wordt het virus toch terug actief, dan kan dit zona (gordelroos) veroorzaken.

Meestal verlopen windpokken zonder verwikkelingen. Soms doen er zich echter complicaties voor, zoals longontsteking, bacteriële bijbesmetting of ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis). Zeer zelden zien we dat een kind overlijdt als gevolg van windpokken (in België ongeveer 1 kind per jaar).

Vaccinatie tegen Varicella beschermt (voor 70 à 100 %) tegen het krijgen van windpokken. Het vaccin kan worden toegediend vanaf de **leeftijd** van **12 maanden**.

De prijs per dosis bedraagt ongeveer 50,00 euro. Dit vaccin wordt niet terugbetaald. Informeer bij je mutualiteit naar eventuele deelname in de kostprijs.

Er zijn **2 dosissen** nodig, met minstens 6 weken tussen.

Vaccinatie tegen Influenza (griep)

Het griepvaccin wordt aangeraden voor kwetsbare groepen zoals oudere mensen en zwangere vrouwen, maar zeker ook voor kinderen ouder dan 6 maanden met chronische problemen zoals longproblemen, hartafwijkingen, nierziekten, afweerstoornissen, ...

Aan gezonde personen die onder hetzelfde dak wonen als baby's jonger dan 6 maanden, of de hierboven beschreven **kwetsbare personen**, wordt ook aangeraden zich te laten vaccineren.

Omdat het griepvirus ieder jaar verandert, moet het vaccin **jaarlijks** worden toegediend, in de maanden **oktober tot december**. De prijs van het vaccin is ongeveer 15,00 euro. Voor chronisch zieken is er een terugbetaling.

Kinderen kunnen gevaccineerd worden vanaf de leeftijd van 6 maanden. Indien je kind jonger dan 9 jaar is en vroeger nog niet tegen griep gevaccineerd werd, krijgt het **de eerste keer 2 dosissen** met een tussentijd van minstens 4 weken. Nadien is telkens **slechts 1 dosis** nodig.

Reisvaccinaties

Wanneer je op reis gaat, kunnen een aantal extra vaccins nodig zijn. Het kan gaan om vaccinatie tegen **tekenencefalitis** (bij reizen naar Scandinavië, Oostenrijk, sommige streken in Duitsland en Oost-Europa) en **hepatitis A, hondsdolheid** of **Japanse encefalitis** (bij meer tropische reizen). Bijna al deze vaccinaties zijn reeds mogelijk op kinderleeftijd en kunnen toegediend worden door je eigen kinderarts.

Voor specifieke vragen over reizen met kinderen – alsook malariaprofylaxe – kan je terecht bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde of in GZA bij onze kinderinfectioloog Dr. Daan Van Brusselen.

