

Vaccinaties kinderen

patiënteninformatie

00020451 - © GZA - juli 2019

Beste ouder(s)

Het is belangrijk om uw kind te vaccineren. De vaccinaties beschermen niet alleen uw kind zelf, maar ook uw gezin en de omgeving. Naast het klassieke vaccinatieschema van Kind en Gezin zijn er nog een aantal vaccinaties sterk aanbevolen. Aan de hand van deze brochure willen we u daarover informeren.

Informatie over reisvaccinatie is niet opgenomen in deze informatiebrochure. Indien u daarover vragen hebt, wendt u zich best tot uw kinderarts, of raadpleegt u de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, aarzel niet om uw arts erover aan te spreken.



campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11

campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 20 00

campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. + 32 3 444 12 11

www.gzaziekenhuizen.be

1. Vaccinatie tegen meningococcen

Meningococcen veroorzaken een ernstige vorm van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Een meningococceïnfectie kan in de loop van enkele uren levensbedreigend zijn.

Vooraf kinderen van 0 tot 5 jaar en jongvolwassenen (15 tot 19 jaar) worden erdoor getroffen.

Er bestaan verschillende types meningococcen. Het vaccin tegen meningococceïnfectie type C zit in het basisvaccinatieschema (van Kind en Gezin) en wordt toegediend op 15 maanden.

Vaccin meningococceïnfectie type B

Er bestaat nu ook een vaccin tegen meningococceïnfectie type B, dat nog niet in het vaccinatieprogramma van Kind en Gezin zit.

Reacties op dit vaccin kunnen wat heviger zijn, zeker wanneer het vaccin samen met andere vaccins wordt toegediend. De bijwerkingen zijn minder hevig indien u **net voor de vaccinatie paracetamol laat toedienen**. Laat na de vaccinatie nog **twee dosissen paracetamol** toedienen met een tussentijd van 4 tot 6 uren.

Het vaccin tegen meningococceïnfectie B kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 2 maanden. De prijs per dosis bedraagt ongeveer € 90,00. Het vaccin tegen meningococceïnfectie B wordt niet terugbetaald. Informeer bij uw mutualiteit naar eventuele deelname in de kostprijs.

- **Bij opstart na** de leeftijd van **2 maanden** zijn er **4 dosissen** nodig.
- **Bij opstart na** de leeftijd van **3 maanden** zijn er **3 dosissen** nodig.
- **Bij opstart na** de leeftijd van **2 jaar** zijn er **2 dosissen** nodig.

Gecombineerd vaccin meningococceïnfectie types A, C, W, Y

Er bestaat ook een gecombineerd vaccin tegen meningococceïnfectie types A, C, W, Y. Dat vaccin zit niet in het vaccinatieprogramma van Kind en Gezin. Subtypes A, W en Y komen voornamelijk voor in landen van de Afrikaanse subsahara, waardoor deze vaccinatie onder de reisvaccinatie valt (cfr. Tropisch Instituut).

In 2018 werden in Nederland echter verschillende gevallen gezien van besmetting met de meningococceïnfectie W-bacterie bij adolescenten, waardoor dit vaccin in Nederland aangeboden wordt op de leeftijd van 14 maanden en voor alle tieners van 15 tot 18 jaar.

In België zijn er momenteel nog geen duidelijke richtlijnen, maar is het vaccin wel beschikbaar.

Het vaccin kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 2 maanden. De prijs per dosis bedraagt ongeveer € 55,00. Het vaccin wordt niet terugbetaald.

Informeer bij uw mutualiteit naar eventuele deelname in de kostprijs.

- **Bij opstart na** de leeftijd van **2 maanden** zijn er **3 dosissen** nodig.
- **Bij opstart na** de leeftijd van **1 jaar** is er **1 dosis** nodig.

2. Vaccinatie tegen Varicella (windpokken)

Bijna iedereen krijgt als kind windpokken, het is een typische kinderziekte. Kinderen genezen meestal na enkele dagen. Na genezing bent u levenslang tegen windpokken beschermd. Het virus blijft echter wel sluimerend aanwezig in het lichaam. Wordt het virus toch terug actief, dan kan dat zona (gordelroos) veroorzaken.

Meestal verlopen windpokken zonder verwickelingen. Soms doen er zich complicaties voor, zoals longontsteking, bacteriële bijbesmetting of ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis). Zeer zelden zien we dat een kind overlijdt als gevolg van windpokken (in België ongeveer 1 kind per jaar).

Vaccinatie tegen Varicella beschermt tegen het krijgen van windpokken.

Het vaccin kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 12 maanden. De prijs per dosis bedraagt ongeveer € 50,00. Er zijn 2 dosissen nodig, met minstens 6 weken tussen. Het vaccin tegen Varicella wordt niet terugbetaald.

Informeer bij uw mutualiteit naar eventuele deelname in de kostprijs.

3. Vaccinatie tegen Influenza (griep)

Het griepvaccin is aangeraden voor kwetsbare groepen zoals oudere mensen en zwangere vrouwen, maar zeker ook voor kinderen ouder dan 6 maanden met chronische problemen zoals longproblemen, hartafwijkingen, nierziekten, afweerstoornissen...

We raden gezonde personen die onder hetzelfde dak wonen als baby's jonger dan 6 maanden, of de hierboven beschreven kwetsbare personen, ook aan om zich te laten vaccineren. Omdat het griepvirus ieder jaar verandert, moet het vaccin **jaarlijks** worden toegediend, in de maanden **oktober tot december**.

Kinderen vanaf 6 maanden en ouders krijgen één dosis. Indien uw kind jonger dan 9 jaar is en vroeger nog niet tegen griep gevaccineerd werd, moet een tweede dosis toegediend worden na een tussentijd van minstens 4 weken.

De prijs van het vaccin is ongeveer € 15,00. Voor chronisch zieken is er een terugbetaling.